

## IPL (600-950/645-750nm)

### アプリケーターで脱毛治療を受けられる方へ説明・同意書

医療脱毛：ノーリス(I2PL)による脱毛

I2PL であるノーリスは、医療脱毛として認可を受けています。

熱傷や色素沈着のリスクが低いのが特徴です。

毛周期に併せて6週間前後に1回の頻度で行います。施術回数は5回が目安となります。

注意) ①日焼けが強い部分には照射できないことがあります。

②照射後は日焼け止めをしっかりと塗って下さい。

参考) 女性には女性看護師が担当いたします。

#### 治療が受けられない方・禁忌

下記の病気や症状がある方、下記薬剤の使用中的の方は治療を受けられません。

- ・ペースメーカーや植え込み式除細動器使用中、重篤な心疾患に罹患
- ・糖尿病などの内分泌疾患に罹患しており、創傷治療に障害がある
- ・免疫抑制を引き起こす疾患、免疫抑制剤使用中
- ・出血性疾患に罹患、抗凝固薬を内服中
- ・妊娠中、またその可能性がある
- ・ケロイド体質
- ・発熱している・全身状態が芳しくない
- ・光過敏性発作・光線過敏症に関連した疾患に罹患・既往
- ・光過敏症を誘発する薬剤・外用薬・サプリメントを使用中
- ・育毛剤使用中 ex.ミノキシジル内服中

#### 治療後注意事項と自己ケアについて

- ・脱毛後は、毛孔周囲に赤み(軽度の熱による炎症) がおこる場合もあります。  
通常数時間～24時間以内に赤み・ヒリヒリ感は消失します。その後小さな丘疹となり自然に治ります。
- ・炎症が引かず、痒みや熱傷等の症状を呈した時は来院して下さい。
- ・治療中、または治療後6カ月間は強い日焼けを避けるようにして下さい。
- ・治療後は、保湿剤や日焼け止め(SPF30以上) を使用して、スキンケアを行って下さい。
- ・照射後2週間程度は毛が残存します。残存している毛は、毛根がダメージを受けているため自然と抜け落ちます。

#### 副作用

- ・疼痛、発赤、浮腫/腫脹、熱傷、痂皮形成、水疱、一過性の炎症性色素沈着、色素脱失、軽度の瘢痕形成

私は、上記の内容の説明を十分に受け理解し、治療を受けることに同意します。

年 月 日 患者氏名 \_\_\_\_\_

義澤皮膚科内科クリニック

TEL 042-697-9923